

***Η εμπειρία από την χρήση των  
ψυχοτρόπων φαρμάκων στα ανοϊκά  
σύνδρομα, στο τμήμα Κινητικών και  
Νοητικών διαταραχών του Αιγινητείου  
Νοσοκομείου***

***Γιώργος Παρασκευάς***

Επίκ. Καθηγητής Α΄ Νευρολογική κλινική  
Παν/μίου Αθηνών

***Μάρκος Ζαχαρής***

Υπεύθυνος Κοινωνικής Υπηρεσίας  
Α΄ Νευρολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

***Ελισσάβητ Καπάκη***

Αναπλ. Καθηγήτρια, Α΄ Νευρολογική Κλινική  
Παν/μίου Αθηνών

*Αιγινητείο Νοσοκομείο*



# Μελετηθέντες ασθενείς

---

**Ποσοστά χορήγησης ψυχοτρόπων  
φαρμάκων προ της εισαγωγής και  
μετά την έξοδο από την κλινική κατά  
την χρονική περίοδο ΙΑΝ 2011 έως  
ΑΠΡ 2012.**

**$N = 134$  νοσηλευόμενοι ασθενείς  
ηλικία:  $63 \pm 11$  έτη  
MMSE:  $21 \pm 6$**




# Αντιψυχωσικά

---


- Προ της εισαγωγής : 25 (18,7%)
- Κατά την έξοδο : 21 (15,7%)

### Νεότερα (άτυπα) αντιψυχωσικά



Νεότερα (άτυπα) αντιψυχωσικά	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	22	16,42%
ΜΕΤΑ	18	13,43%

### Παλαιότερα (τυπικά) αντιψυχωσικά



Παλαιότερα (τυπικά) αντιψυχωσικά	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	3	2,24%
ΜΕΤΑ	3	2,24%




## «Αντικαταθλιπτικά»

---

- Προ της εισαγωγής : 55 (41%)
- Κατά την έξοδο : 62 (46.3%)


### Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI's)



#### Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI's)

	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	41	30,60%
ΜΕΤΑ	49	36,57%


### Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης - νορεπινεφρίνης (SNRI's)



Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης - νορεπινεφρίνης (SNRI's)	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	9	6,72%
ΜΕΤΑ	7	5,22%




### Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά



Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	0	0,00%
ΜΕΤΑ	1	0,75%


### Νοραδρενεργικά - ειδικά σεροτονινεργικά



#### Νοραδρενεργικά - ειδικά σεροτονινεργικά

	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	5	3,73%
ΜΕΤΑ	5	3,73%

### Βενζοδιαζεπίνες



Βενζοδιαζεπίνες	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	20	14,93%
ΜΕΤΑ	18	13,43%




## «Αντιανοϊκά φάρμακα»

---


- Προ της εισαγωγής : 58 (43,3%)
- Κατά την έξοδο : 70 (52,2%)

### Αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης



Αναστολέας ακετυλοχολινεστεράσης	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	41	30,60%
ΜΕΤΑ	41	30,60%

## Μεμαντίνη



Μεμαντίνη	N	Ποσοστό %
ΠΡΟ	17	12,69%
ΜΕΤΑ	29	21,64%

**$P = 0,05$**



# Συμπεράσματα

---

Παρατηρείται τάση

- για μείωση χορήγησης αντιψυχωσικών
- Για αύξηση της χορήγησης SSRIs
- Για μείωση χορήγησης βενζοδιαζεπινών

Παρατηρείται στατιστικά σημαντική

- αύξηση στη χορήγηση μεμαντίνης



***Ευχαριστώ***

*Αιγινήτειο Νοσοκομείο*